

COVID-19 vaccination - what can you get?

NHS

IF YOU ARE...

- Aged 75+ or you live in a care home for older adults

- Aged 18 to 74

- Aged 16 to 17

- Aged 12+ and you are, or have been, immunosuppressed

- Aged 12-15 and with a health condition that puts you at higher risk from COVID-19, or you are a household contact of someone who is immunosuppressed

- Aged 12-15 and not in any of the above groups

- Aged 5-11 with a health condition that puts you at higher risk from COVID-19, or you are a household contact of someone who is immunosuppressed

YOU CAN GET...

- Two doses, at least eight weeks apart
- Booster from three months (91 days) after second dose
- Spring booster around 182 days (six months) after previous dose, unless invited earlier

- Two doses, at least eight weeks apart
- Booster from three months (91 days) after second dose

- Two doses, at least 12 weeks apart
- Booster from three months (91 days) after second dose

- Two doses, at least eight weeks apart
- If severely immunosuppressed at the time of earlier doses, a third primary dose, typically eight weeks after second dose (timing may vary and should be discussed with a clinician)
- Booster dose and spring booster from three months (91 days) after previous dose

- Two doses, at least eight weeks apart
- Booster from three months (91 days) after second dose

- Two doses, at least eight weeks apart
- Booster dose under review

- Two doses, at least eight weeks apart
- Booster dose under review

COVID-19 રસીકરણ - તમે શું મેળવી શકો છો?

જો તમે 75+ છો અથવા વૃદ્ધ વયસ્કો માટેના કેર હોમમાં રહો છો.

બે ડોઝ, ઓછામુંં ઓછા આઠ અઠવાડિયા ફર.

બૂસ્ટર - બીજા ડોઝના 3 મહિના (91 દિવસ) પછી, બૂસ્ટર લઈ શકાય છે.
સ્પ્રોગ બૂસ્ટર - અગાઉના ડોઝના આશરે 182 દિવસ (૭ મહિના) પછી લંઈ શકાય છે, સિવાય કે અન્યથા આમંત્રિત કરવામાં આવે.

જો તમે 18-74 વર્ષના છો.

બે ડોઝ, ઓછામુંં ઓછા આઠ અઠવાડિયાના અંતરે.

બૂસ્ટર - બીજા ડોઝના 3 મહિના (91 દિવસ) પછી, બૂસ્ટર લઈ શકાય છે.

જો તમારી ઉંમર 16-17 વર્ષ છે. જો

બે ડોઝ, ઓછામુંં ઓછા 12 અઠવાડિયાના અંતરે.

બૂસ્ટર - બીજા ડોઝના 3 મહિના (91 દિવસ) પછી, બૂસ્ટર લઈ શકાય છે

તમારી ઉંમર 12-15 વર્ષની હોય અને એવી સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિ હોય કે જે તમને COVID-19ના ઉચ્ચ જોખમમાં મૂકે છે, અથવા તમે રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતા વ્યક્તિ સાથે ઘરના સંપર્કમાં છો.

બે ડોઝ, ઓછામુંં ઓછા આઠ અઠવાડિયા ફર.

બૂસ્ટર - બીજા ડોઝના 3 મહિના (91 દિવસ) પછી, બૂસ્ટર લઈ શકાય છે

જો તમારી ઉંમર 12-15 છે અને ઉપરોક્ત કોઈપણ જીથમાં નથી.

બે ડોઝ, ઓછામુંં ઓછા આઠ અઠવાડિયા ફર.

બૂસ્ટર ડોઝની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે.

જો તમારી ઉંમર 5-11 વર્ષની હોય અને એવી સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિ હોય કે જે તમને COVID-19ના ઉચ્ચ જોખમમાં મૂકે છે, અથવા તમે રોગપ્રતિકારક શક્તિથી પ્રભાવિત વ્યક્તિ સાથે ઘરના સંપર્કમાં છો.

બે ડોઝ, ઓછામુંં ઓછા આઠ અઠવાડિયા ફર.

બૂસ્ટર ડોઝની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે.

જો તમારી ઉંમર 12+ છે અને તમે ઈગ્યુનોસપ્રેસ છો અથવા બની ગયા છો.

બે ડોઝ, ઓછામુંં ઓછા આઠ અઠવાડિયા ફર. જો તમને પ્રથમ ડોઝના સમયે ગંભીર રીતે રસીકરણ કરવામાં આવ્યું હોય, તો ત્રીજો પ્રાથમિક ડોઝ લેવામાં આવી શકે છે, સામાન્ય રીતે બીજા ડોઝના આઠ અઠવાડિયા પછી (સમય બદલાઈ શકે છે અને ચિકિત્સક સાથે ચર્ચા કરવી જોઈએ). બૂસ્ટર ડોઝ અને સ્પ્રોગ બૂસ્ટર - અગાઉના ડોઝ પછીના ત્રણ મહિનાથી.

கோவிட்-19 தடுப்புசி - நீங்கள் என்ன பெற முடியும்?

நீங்கள் 75+ அல்லது நீங்கள் வயதானவர்களுக்கான பராமரிப்பு இல்லத்தில் வசிக்கிறீர்கள் என்றால்

இரண்டு டோஸ்கள், குறைந்தது எட்டு வாரங்கள் தொலைவில். பூஸ்டர் - பூஸ்டர் இரண்டாவது டோஸாக்குப் பிறகு 3 மாதங்கள் (91 நாட்கள்) எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸ்பிரிங் பூஸ்டர் - முன்பு அழைக்கப்பட்டிருந்தால் தவிர, கடைசி டோஸாக்குப் பிறகு சுமார் 182 நாட்கள் (ஆறு மாதங்கள்) எடுக்கலாம்.

உங்களுக்கு 18- 74 வயது என்றால்.

இரண்டு டோஸ்கள், குறைந்தது எட்டு வாரங்கள் தொலைவில். பூஸ்டர் - பூஸ்டர். இரண்டாவது டோஸாக்குப் பிறகு 3 மாதங்கள் (91 நாட்கள்) எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

நீங்கள் 16-17 வயதுடையவராக இருந்தால்.

இரண்டு டோஸ், குறைந்தது 12 வாரங்கள் தொலைவில். பூஸ்டர் - இரண்டாவது டோஸாக்குப் பிறகு 3 மாதங்கள் (91 நாட்கள்) பூஸ்டர் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

நீங்கள் 12-15 வயதுடையவராகவும், உங்களை கோவிட்-19 இன் அதிக ஆபத்தில் ஆழ்த்தும் ஒரு சுகாதார நிலையுடனும் இருந்தால், அல்லது நீங்கள் நோயெதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட ஒருவரின் உள்நாட்டுத் தொடர்பாளராக இருந்தால்.

இரண்டு டோஸ்கள், குறைந்தது எட்டு வாரங்கள் தொலைவில். பூஸ்டர் - இரண்டாவது டோஸாக்குப் பிறகு 3 மாதங்கள் (91 நாட்கள்) பூஸ்டர் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

நீங்கள் 12-15 வயதுடையவராக இருந்தால், மேலே உள்ள குழுக்களில் எதிலும் இல்லை.

இரண்டு டோஸ்கள், குறைந்தது எட்டு வாரங்கள் தொலைவில். பூஸ்டர் டோஸ் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.

நீங்கள் 5-11 வயதுடையவராகவும், உங்களை கோவிட்-19 இன் அதிக ஆபத்தில் ஆழ்த்தும் ஒரு சுகாதார நிலையுடனும் இருந்தால், அல்லது நீங்கள் நோயெதிர்ப்புத் திறன் குறைந்த ஒருவரின் வீட்டுத் தொடர்பாளராக இருந்தால்.

இரண்டு டோஸ்கள், குறைந்தது எட்டு வாரங்கள் தொலைவில். பூஸ்டர் டோஸ் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.

நீங்கள் 12+ மற்றும் நீங்கள் இருந்தால் அல்லது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்துவிட்டிருக்கள்.

இரண்டு டோஸ்கள், குறைந்தது எட்டு வாரங்கள் தொலைவில். முதல் டோஸின் நேரத்தில் நீங்கள் கடுமையாகத் தடுப்புசி போட்டுக்கொண்டால், முன்றாவது முதன்மை டோஸ் எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம், வழக்கமாக இரண்டாவது டோஸாக்கு எட்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு (நேரம் மாறுபடலாம் மற்றும் ஒரு மருத்துவரிடம் விவாதிக்கப்பட வேண்டும்). பூஸ்டர் டோஸ் மற்றும் வசந்த பூஸ்டர் - கடைசி டோஸாக்கு முன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு.